

# PRÉPARATION DE SALLE DÉCHOCAGE AVANT L'ARRIVÉE ET TRANSFERT D'UN POLYTRAUMATISÉ


1




## Préparation 15 minutes à 2 personnes

1. Sortir le marche-pied et le chariot défibrillateur du déchocage
2. Positionner le brancard à 90° pour transfert
3. Positionner le matelas de transport
4. Mise en place de l'under-cover et mise en chauffe
5. Mise en place de la ceinture pelvienne
6. Apporter et placer
  - L'échographe branché et allumé
  - Le perfuseur-réchauffeur
  - Le plateau d'intubation sur l'adaptable + 2 sondes 7 et 7,5
7. Positionner à l'extérieur du déchocage
  - La girafe à radio
  - Le chariot KT et la table métallique
8. Positionner le chariot déchoc sous la « fenêtre » et sortir les ampoules :
  - Anesthésie :
    - TRACRIUM
    - SUFENTANYL
    - DIPRIVAN
    - ETOMIDATE (uniquement si non intubé)
    - CELOCURINE (uniquement si non intubé)
  - Hémodynamique
    - NORADRÉNALINE
    - ADRÉNALINE
    - ÉPHÉDRINE (uniquement si non intubé)

8



2 à 6



7



## Transfert



## Transfert du patient

- 8 personnes nécessaires : 1 Trauma Leader qui se positionne à la tête /3 SP / 1 ambulancier SMUR / 1 IADE SMUR / 1 IDE déchoc + 1 AS qui retire le matelas coquille.

NB : En fin de prise en charge, Remplir la feuille polytrauma (2 feuillets recto-verso) en essayant d'être précis sur les horaires, la déposer dans la bannette prévue (entre les 2 salles du déchocage) puis réarmer la salle.